SOJA

Orientações para o Manejo da Resistência a Inseticidas

Baixar orientações detalhadas sobre Manejo da Resistência a Inseticidas
www.bit.do/mri-irac

Consultar Modos de Ação de Inseticidas
www.bit.do/moa-irac

Soja Não-*Bt*



- Somente aplique inseticidas se a densidade populacional da praga atingir o nível de controle.
- Utilize janelas* de aplicação de inseticidas.
- Rotacione inseticidas com diferentes modos de ação.
- No caso de utilização de sementes tratadas, pode-se realizar pulverização de um inseticida com mesmo modo de ação apenas dentro da janela de 30 dias.
- Dê preferência para os inseticidas seletivos aos inimigos naturais.
- Não repita a mesma mistura pronta de inseticidas. Caso for utilizada uma mistura, recomenda-se não utilizar inseticidas que apresentem o mesmo mecanismo de ação na próxima janela ou em rotação.
- Evite inseticidas para os quais há casos comprovados recentemente de resistência na região do cultivo.
- Elimine plantas tigueras e espontâneas.
- Faça rotação de culturas.

Soja *Bt*



- Siga as orientações dos fornecedores das sementes sobre a recomendação para pulverização foliar.

Refúgio (mínimo de 20% da área)



- Distância máxima de 800 m da plantação de soja *Bt*.
- Faixas dentro do campo da cultivar *Bt* são preferíveis.
- Observe doses e níveis de ação recomendados em bula para pulverização foliar.
- O uso de pulverização com inseticida foliar com *Bacillus thuringiensis* não é recomendado para o refúgio.

Legenda

- Inseticida foliar
- Inseticida aplicado em tratamento de sementes
- Q W X Y Z — Grupos de Modo de Ação (códigos fictícios)

* Janela = período de uma geração da praga

IRAC
Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas
Brasil