

Orientações para o Manejo da Resistência a Inseticidas



Baixar orientações detalhadas sobre Manejo da Resistência a Inseticidas

www.bit.do/mri-irac



Consultar Modos de Ação de Inseticidas

www.bit.do/moa-irac

Algodão Não-Bt

	Janela de pré-plantio	Janela 1	Janela 2	Janela 3	Janela 4	Janela 5	
LAGARTAS	.÷.@		.÷.₩	***	.∴.⊗ .∴.®		
MOSCA-BRANCA			<i>.</i> ÷.⊗	.4.0 .4.0	<i>.</i> ∜. 6		
BICUDO					.÷.@		
PULGÃO, ÁCARO		.÷.0				. ∜. ®	
		, ,					
	pré-plantio	٧	egetativo/		reprodutivo		

- Somente aplique inseticidas se a densidade populacional atingir o nível de controle.
- Utilize janelas* de aplicação de inseticidas.
- Rotacione inseticidas com diferentes modos de ação.
- No caso de utilização de sementes tratadas, pode-se realizar pulverização de um inseticida com mesmo modo de ação apenas dentro da janela de 30 dias.
- Dê preferência para os inseticidas seletivos aos inimigos naturais.
- Não repita a mesma mistura pronta de inseticidas. Caso for utilizada uma mistura, recomenda-se não utilizar inseticidas que apresentem o mesmo mecanismo de ação na próxima janela ou em rotação.
- Evite inseticidas para os quais há casos comprovados recentemente de resistência na região do cultivo.
- Elimine plantas tigueras e espontâneas.
- Faça rotação de culturas.

Inseticida foliar Inseticida aplicado em tratamento de sementes GROB Grupos de Modo de Ação (códigos fictícios)

Algodão Bt

•	, ligodi						
	Janela de pré-plantio	Janela 1	Janela 2	Janela 3	Janela 4	Janela 5	
LAGARTAS	.÷.•2		<i>.</i> ÷. ♡	.∱.®	.÷.⊗		
MOSCA-BRANCA			<i>.</i> ÷.⊗	.÷.0 .÷.0	.÷.6		
BICUDO				.4.₩ .4.₩	.÷.₩		
PULGÃO, ÁCARO		∴∴⊙				.÷.®	
	pré-plantio	٧	egetativo/		reprodutivo		

 Siga as orientações dos fornecedores das sementes sobre a recomendação para pulverização foliar.

Refúgio (mínimo de 20% da área)

LAGARTAS A. Q A.		Janela de pré-plantio	Janela 1	Janela 2	Janela 3	Janela 4	Janela 5	
MOSCA-BRANCA	LAGARTAS	.÷.@		<i>.</i> 4. ⊘	. ∴ R	<i>.</i> ÷.⊗		
	MOSCA-BRANCA			<i>.</i> ÷.⊗		<i>:</i> ::::6		
	, • ,					.÷. w		
PULGÃO, ÁCARO	PULGÃO, ÁCARO		. ⊹.⊙				. ∜. ⊗	
			, ₆₀ ,	. ★• ∰ :				
pré-plantio vegetativo reprodutivo								

- Distância máxima de 800 m da plantação de algodão Bt.
- Faixas dentro do campo da cultivar Bt são preferíveis.
- Observe doses e níveis de ação recomendados em bula para pulverização foliar.
- O uso de pulverização com inseticida foliar com Bacillus thuringiensis não é recomendado para o refúgio.



^{*} Janela = período de uma geração da praga